

NO DEJES QUE LOS ROEDORES DAÑEN TU NEGOCIO

Ratón doméstico



Tamaño: 2.5-3.5"

más comunes y especies de roedores económicamente significativas

ratón ciervo



Tamaño: 2.75-4"

Plaga estructural que se encuentra en zonas rurales, suburbanas o zonas boscosas

Rattus Norbergicus (rata parda, rata desagüe)



Tamaño: 7-9.5"

Encontrado en Perú y en todo el mundo.

Rattus Rattus (rata negra, rata techo)



Tamaño: 6-8"

Presencia mundial; es más común en la costa, puertos marítimos y el tercio sur del país.

SOBRE LA COMIDA

- Los roedores se sienten atraídos por las instalaciones por el calor y los olores emitidos.
- Pueden escabullirse a través de puertas abiertas o pequeños huecos o hacer autostop con las mercancías entrantes.
- Las ratas y los ratones son capaces de roer los envases para llegar a una fuente de alimento.



UN SOLO PAR DE
LO 3 RATONES PUEDEN COMER
4 LIBRAS
DE ALIMENTOS EN UN AÑO



Y CONTAMINAN 10X ESA CANTIDAD
CON ORINA Y EXCESO



DOS ROEDORES SE PUEDEN VOLVER RÁPIDAMENTE EN UNA INFESTACIÓN

Debido a que los roedores son reproductores prolíficos y rara vez se ven durante el día o cuando la operación está en pleno apogeo, una infestación puede desarrollarse rápidamente.



RATONES

Período de gestación: 18-21 días

Tamaño de la camada: 2-13

Madurez Sexual: 35-60 días

**UN SOLO RATÓN PUEDE
CRECE RÁPIDAMENTE A 11,000
RATONES BEBÉ ANUALMENTE**



ratas

Período de gestación: 20-25 días

Tamaño de la camada: 3-8

Madurez Sexual: 70-90 días

**UNA SOLA RATA PUEDE
CRECE RÁPIDAMENTE HASTA 1500
RATAS BEBÉ ANUALMENTE**

NO DEJES QUE LOS ROEDORES DAÑEN TU NEGOCIO



**DAÑO A SU
MARCA
Y REPUTACIÓN**



**MOLESTO TU
HUÉSPEDES**



**POTENCIAL
COMPENSACIÓN**
RECLAMACIÓN (ES)



**REPRESENTAN A LOS POBRES
SANEAMIENTO**

SOBRE LA COMIDA

Según los CDC, las ratas y los ratones pueden transmitir más de **35 enfermedades** a los humanos, incluyendo:

Salmonella spp., Disentería amebiana, Ántrax, Cólera, Difteria, Hantavirus, Hepatitis, Enfermedad de Lyme, Oftalmía, Shigella, Estreptococo, Tuberculosis y Fiebre tifoidea

DIFUSIÓN VÍA:



DOS ROEDORES SE PUEDEN VOLVER RÁPIDAMENTE EN UNA INFESTACIÓN

1 EDUCAR A LOS EMPLEADOS

Los empleados son la primera defensa contra los roedores. Enséñeles a alertar manejo ante signos de excrementos, nidos y empaques roídos

2 MANTENGA LA COMIDA Y EL AGUA FUERA DE ALCANCE

Almacenar alimentos en sellado recipientes y tapa basura para eliminar su suministro de alimentos

3 SIN AGUJEROS, SIN ENTRADA

Reducir la entrada de roedores oportunidades sellando puertas y llenando huecos y huecos



4

ELIMINAR EL DESORDEN INNECESARIO

El desorden puede dificultar la inspección y el control del posible comportamiento de los roedores

5

CAMBIO DE ESTACIONES = CAMBIO DE ENFOQUE

Ya sea que su instalación esté ubicada en el gélido norte o en el caluroso sur, los meses de invierno significan un clima más fresco que puede afectar significativamente el comportamiento de las plagas, así que revise sus protocolos de prevención de plagas.

6

EQUIPO CON UNA PLAGA PROVEEDOR DE GESTION

Elija un socio que pueda ofrecer un Manejo Integrado de Plagas sostenible (IPM) para minimizar los riesgos económicos, de salud y ambientales y hacer que su negocio vuelva a funcionar rápidamente

